

128 Águila-azor perdicera



Águila-azor perdicera. Adulto (14-III).

ÁGUILA-AZOR PERDICERA (*Hieraaetus fasciatus*)

IDENTIFICACIÓN

66-74 cm. **Adultos** con partes superiores oscuras; partes inferiores blancas, estriadas de oscuro; cola pardo-gris, con varias barras oscuras; alas oscuras por arriba y más claras y sombreadas de oscuro por debajo; patas amarillas. **Juveniles** con tonos rojizos.

ESPECIES SIMILARES

En mano, la cola larga, patas poderosas con tarsos emplumados y el diseño del plumaje diferencian a esta especie del resto de rapaces de tamaño similar.

SEXO

Ambos sexos con plumaje similar, si acaso **macho** de promedio más blanco y con estriado que la **hembra** de su misma edad. Tanto **juveniles** como **adultos** pueden sexarse por el tamaño en los casos extremos: **machos** con ala menor de 468 mm. **Hembras** con ala mayor de 510 mm.

MUDA

Muda **postnupcial** completa, si bien pueden no reemplazarse todas las plumas de vuelo cada año; comienza habitualmente en julio-agosto para estar terminada en enero. La muda **postjuvenil** comienza en su 2º año de vida, dejando sin mudar algunas plumas de vuelo y a veces parte de la cola, que serán cambiadas en su 3º año de vida.

EDAD

Pueden reconocerse 3 tipos de edad:

Juvenil con dorso marrón oscuro, a menudo con un ligero moteado claro; cabeza marrón; partes inferiores ocre; todas las plumas del ala y cola de una sola generación; parte inferior del ala con infracoberteras ocre y denso y regular barreado en las plumas de vuelo; plumas de cola marrón claro, con 8-9 barras oscuras sin banda ancha terminal.

2º año otoño/3º año primavera con dorso bastante similar al adulto; partes inferiores blanco-amarillento; plumas de vuelo, y frecuentemente cola, con límite de muda entre las plumas **juveniles** retenidas y las mudadas de tipo **adulto**.

Adultos con dorso gris-marrón oscuro, a veces moteado de blanco; capirote y auriculares más oscuros que el resto de la cabeza; partes inferiores blancas con estriado oscuro; parte inferior del ala gris oscuro; si hay límite de muda todas las plumas son de tipo adulto; plumas de la cola grises, con barreado fino y con una banda oscura subterminal más ancha.

CUIDADO: en los primeros años (ejemplares **subadultos**) muestran las partes inferiores teñidas de ante, si bien no es posible asignar una edad exacta utilizando este carácter debido a la variación existente en el periodo necesario para alcanzar el plumaje típico del **adulto**.

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

ESTATUS EN ARAGÓN

Especie sedentaria que realiza su dispersión juvenil fuera de nuestra Comunidad; es un ave propia de ambientes mediterráneos en zonas de media montaña.



Águila-azor perdicera. Subadulto (05-XII).

128 Águila-azor perdicera



Águila-azor perdicera. 2º año (05-XII).



Águila-azor perdicera. Diseño de la cabeza; arriba 2º año (05-XII); abajo juvenil (05-XII)



Águila-azor perdicera. Juvenil (05-XII).



Águila-azor perdicera. Diseño del pecho: izquierda adulto (14-III); derecha subadulto (05-XII)



Águila-azor perdicera. Diseño de la cabeza: arriba adulto (14-III); abajo subadulto (05-XII)



Águila-azor perdicera. Diseño del pecho: izquierda 2º año (05-XII); derecha juvenil (14-III)

128 Águila-azor perdicera



Águila-azor perdicera. Diseño del obispo: izquierda adulto (14-III); derecha subadulto (05-XII)

Águila-azor perdicera. Diseño del dorso: izquierda adulto (14-III); derecha subadulto (05-XII)



Águila-azor perdicera. Diseño del obispillo: izquierda 2º año (05-XII); derecha juvenil (14-III)



Águila-azor perdicera. Diseño del dorso: izquierda 2º año (05-XII); derecha juvenil (05-XII)

Águila-azor perdicera. Diseño de la cola: izquierda adulto (14-III); derecha subadulto (05-XII)

128 Águila-azor perdicera



Águila-azor perdicera. Diseño de coberteras primarias: arriba adulto (14-III); abajo sub-adulto (05-XII)

Águila-azor perdicera. Diseño de la cola: izquierda 2º año (1 pluma juvenil; 2 pluma de 2º año) (14-III); derecha juvenil (14-III)



Águila-azor perdicera. Diseño de coberteras primarias: arriba 2º año (14-III); abajo juvenil (14-III)

Águila-azor perdicera. Diseño de las infracoberteras de la cola: izquierda adulto (14-III); derecha subadulto (05-XII)



Águila-azor perdicera. Diseño de infracoberteras del ala: arriba adulto (14-III); abajo subadulto (05-XII)

Águila-azor perdicera. Diseño de las infracoberteras de la cola: izquierda 2º año (14-III); derecha juvenil (14-III)

128 Águila-azor perdicera



Águila-
a z o r -
perdicera. Dise-
ño de
infracor-
berteras
del ala:
arriba 2º
año (14-
I I I) ;
a b a j o
juvenil
(14-III)



Águila-azor perdicera. Adulto: diseño de primarias (14-III)

Águila-azor perdicera. Subadulto: diseño de primarias (05-XII)



Águila-azor perdicera. 2º año: diseño de primarias (1 pluma juvenil; 2 pluma de 2º año) (05-XII)

128 Águila-azor perdicera



Águila-azor perdicera. Juvenil: diseño de primarias (14-III)

Águila-azor perdicera. Subadulto: diseño de secundarias (05-XII)



Águila-azor perdicera. Adulto: diseño de secundarias (14-III)

Águila-azor perdicera. 2º año: diseño de secundarias (05-XII)

128 Águila-azor perdicera



Águila-azor perdicera. Subadulto: diseño del ala (05-XII)



Águila-azor perdicera. Juvenil: diseño de secundarias (14-III)



Águila-azor perdicera. 2º año: diseño del ala (05-XII)



Águila-azor perdicera. Adulto: diseño del ala (14-III)



Águila-azor perdicera. Juvenil: diseño del ala (14-III)